

## Rejection – Liver

## Rechazo – Hígado

El rechazo de trasplantes ocurre cuando el sistema inmune del paciente reconoce que el nuevo hígado es diferente. El trabajo del sistema inmune es protegernos de cosas que pueden ser dañinas, como gérmenes o células cancerosas o aquellas células que provienen de un nuevo órgano. Esta es una parte normal del trasplante y se trata con medicamentos.

Existen varios medicamentos contra el rechazo para ayudar a tratar el rechazo del injerto. Ya que cada paciente de trasplante es diferente, el equipo ordenará una combinación de medicamentos que funcione mejor para cada paciente.

### Types of rejection:

#### Tipos de rechazo:

- **El rechazo agudo** ocurre con mayor frecuencia en las primeras semanas o meses después del trasplante, pero puede ocurrir en cualquier momento. Ocurre cuando el cuerpo siente que el nuevo órgano es diferente y causa inflamación o irritación de las células del hígado. Se trata con esteroides y cambios en los medicamentos contra el rechazo.
- **El rechazo crónico** ocurre con mayor frecuencia meses o años después del trasplante. Ocurre lentamente cuando el cuerpo ataca las células del hígado. No implica inflamación, por lo que no se puede

tratar con esteroides. Ocurre en aproximadamente el 10 por ciento de los pacientes con trasplante de hígado. Un pequeño porcentaje de pacientes que tienen rechazo crónico, con el tiempo, pueden necesitar otro trasplante.

### Signs and symptoms:

#### Signos y síntomas:

- similar a la gripe
- escalofríos, fiebre y dolores corporales
- la mayoría no tiene síntomas

La manera más común de encontrar rechazo es a través de análisis de laboratorio y una biopsia de hígado. Un aumento de las pruebas de función hepática nos dice que algo está molestando al hígado. Esto podría ser un virus, medicamento, rechazo o error de laboratorio. Si las pruebas de función hepática son más altas, el primer paso es repetir el laboratorio. Si las pruebas de función hepática permanecen altas, se ordenará una biopsia hepática y / o una prueba de radiología (como un ultrasonido) para tratar de resolver el problema.

### Summary:

#### Resumen:

- El rechazo es un problema común después de un trasplante. El rechazo puede ocurrir en cualquier momento.
- Los medicamentos contra el rechazo deben tomarse según lo ordenado. Si olvida las dosis de medicamentos habitualmente, esto puede causar rechazo.

- Si tiene problemas para tomar u obtener sus medicamentos, llame a la oficina de trasplantes.
- Usted juega el papel más importante en su atención médica: mantenga la calma, manténgase saludable y manténgase en contacto con el equipo de trasplante.